

ШКАЛА БОЛИ ДЛЯ НЕВЕРБАЛЬНЫХ ПАЦИЕНТОВ

Невербальные больные (пациенты в коме, пациенты с деменцией и другими когнитивными нарушениями) чаще остаются необезболенными, потому что не могут рассказать о своей боли. Не позволяйте им страдать, обращайтесь внимание на невербальные признаки болевого синдрома.

 ПРИЗНАКИ	0	1	2	БАЛЛЫ (0-2)
 ДЫХАНИЕ	В НОРМЕ	ВРЕМЕНАМИ ЗАТРУДНЕНО КРАТКИЕ ПЕРИОДЫ ГИПЕРВЕНТИЛЯЦИИ	ШУМНОЕ ЗАТРУДНЕННОЕ ДЫХАНИЕ. ДЛИТЕЛЬНЫЕ ПЕРИОДЫ ГИПЕРВЕНТИЛЯЦИИ ДЫХАНИЕ ЧЕЙНА СТОКСА	
 ИЗДАВАЕМЫЕ ЗВУКИ	НЕТ	ИНОГДА ЖАЛОБНЫЕ СТОНЫ НЕГРОМКИЕ ЗВУКИ НЕОДОБРЕНИЯ ИЛИ ПОРИЦАНИЯ	ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ БЕСПОКОЙНЫЕ ВЫКРИКИ ГРОМКИЕ ЖАЛОБЫ И СТОНЫ ПЛАЧ	
 ВЫРАЖЕНИЕ ЛИЦА	УЛЫБАЮЩЕЕСЯ ИЛИ НЕЙТРАЛЬНОЕ	ПЕЧАЛЬНОЕ ИСПУГАННОЕ НАСУПЛЕННОЕ	ГРИМАССЫ	
 ПОЗА И ЖЕСТЫ	РАССЛАБЛЕННОСТЬ	НАПРЯЖЕННОСТЬ СТРАДАЛЬЧЕСКИЙ ВИД БЕСПОКОЙНОСТЬ	СУРОВОСТЬ СТИСНУТЫЕ КУЛАКИ ПОДТЯГИВАЕТ ИЛИ ВЫТЯГИВАЕТ СЖАТЫЕ КОЛЕНИ ЭНЕРГИЧНО ДВИГАЕТ РУКАМИ И НОГАМИ	
 ВОЗМОЖНОСТЬ УТЕШИТЬ	НЕ НУЖДАЕТСЯ В УТЕШЕНИИ	МОЖНО ОТВЛЕЧЬ ИЛИ УТЕШИТЬ ГОЛОСОМ ИЛИ ПРИКОСНОВЕНИЕМ	НЕВОЗМОЖНО УТЕШИТЬ, ОТВЛЕЧЬ ИЛИ УСПОКОИТЬ	
 ОБЩИЙ БАЛЛ	Общее количество баллов составляет от 0 до 10. Чем выше балл – тем сильнее боль.			